

Patiënten informatie Kenacort injectie

Inleiding

U heeft vandaag een Kenacort injectie gekregen. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan in deze folder wordt beschreven. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat is een Kenacort injectie en wat is de werking?

Een Kenacort injectie bevat de stoffen Bupivacaïne en Kenacort. Deze 2 stoffen samen zorgen ervoor dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt. Daardoor neemt de pijn en de zwelling af of verdwijnt zelfs helemaal. Daarnaast heeft Bupivacaïne een plaatselijke en tijdelijke verdovende werking. Het duurt enkele dagen tot weken voordat u de werking van de injectie merkt.

De nabehandeling: controleafspraak

Ongeveer 2 weken na de injectie heeft u een controleafspraak. De specialist bespreekt dan met u hoe de injectie heeft gewerkt.

Mogelijke complicaties of bijwerkingen

De artsen en verpleegkundigen doen hun uiterste best om complicaties te voorkomen. Toch houdt iedere ingreep bepaalde risico's in. Bijwerkingen die u mogelijk kunt krijgen zijn:

- Een verergering van de pijn de eerste 2 tot 3 dagen na de injectie.
- Een zwelling op de geïnjecteerde plek. Deze neemt na 2 of 3 dagen vanzelf af.
- Uw gezicht kan enkele dagen na de injectie wat roder kleuren dan normaal. Dit verdwijnt na enkele dagen.
- Hormonale schommelingen ontstaan, waardoor vrouwen last kunnen krijgen van menstruatiestoornissen.
- Bij diabetici kan het bloedsuikergehalte de eerste 2 weken na de injectie een beetje ontregeld zijn. Controleer daarom uw bloedsuiker na de injectie extra goed.
- Een allergische reactie als gevolg van de injectie, maar dit komt zelden voor.

Leefregels

- Als de verdoving (Bupivacaïne) is uitgewerkt, kan de pijn erger worden. Deze pijn neemt meestal 3 dagen na de injectie geleidelijk weer af. Tegen de pijn kunt u maximaal 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. Dat is in totaal 8 tabletten. Tenzij er medische redenen zijn om dit niet te doen. Overleg bij twijfel altijd met uw huisarts of uw behandelend arts.
- Het gewricht kunt u rustig bewegen en normaal belasten. U hoeft na de injectie geen activiteiten achterwege te laten. Door de verdoving kan het gewricht tijdelijk minder pijnlijk zijn. Beperk dan uw activiteiten en doe alleen de dingen die u gewend bent te doen.

Pijndagboek

We adviseren u om de dagen of weken na de injectie bij te houden hoeveel pijn u heeft op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergste pijn). Dit helpt u en de orthopedisch chirurg om een eventuele vervolgbehandeling beter op uw situatie af te stemmen.

Vragen

Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder of doet zich een complicatie voor, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via het centrale telefoonnummer: 043 347 99 44.

Kunt u niet naar een afspraak komen? Geef dit dan ook zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren.



ANNADAL
KLINIEK

Annadal Kliniek
Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

T. 043 - 347 99 44
F. 043 - 347 30 70

www.annadal-kliniek.nl
info@annadal-kliniek.nl

Publicatiedatum 12-10-2020
eQuse 00192