

Adviezen rondom de operatie

- Mocht u nieuwe medicijnen voorgeschreven krijgen die u nog niet aan uw medisch specialist had doorgegeven, neem dan contact op. Sommige medicijnen hebben een nadelige invloed op het herstel na de operatie.
- De operatie vindt plaats onder lokale verdoving.
- De operatie duurt kort.
- U mag gewoon eten en drinken vóór en na de operatie.

- U mag niet zelf naar huis rijden.
- Een lichte pijnstiller zoals paracetamol kunt u na de operatie gebruiken als pijnstiller, tenzij u een allergie hebt tegen dit medicijn. (3 tot 4x per dag 1000mg)

- Koelen mag. Niet met ijs, wel met een koud compres.
- Houdt de wond schoon.
- Na twee dagen mag u de wond wassen onder schoon stromend water (kort).
- Geen sport, niet zwaar tillen tot de controle.
- Ga niet plat liggen en niet bukken tot de controle.

- De wondcontrole vindt plaats na ongeveer 5-7 dagen na de operatie
- Na 6-12 weken na de operatie ziet u nogmaals de medisch specialist om het resultaat te zien.

Optimaal herstel van het litteken

Als uw wond genezen is, mag u het litteken masseren. Vaseline is niet slechter dan litteken crèmes. Meestal kunt u starten ongeveer een week na het verwijderen van de hechtingen.

Bescherm het litteken tegen UV-straling, waaronder zonneshijn, totdat de kleur normaal (huidkleurig) is geworden. U kunt het litteken insmeren met SPF 50 zonnecrème (iedere 2u).

Bij zorgen of problemen, neem contact op

Annadal Kliniek Maastricht
Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht


T. 043 - 347 99 44
F. 043 - 347 30 70

www.annadal-kliniek.nl
info@annadal-kliniek.nl

Last van de bovenoogleden

Met de leeftijd wordt het elastiek in de huid minder elastisch. Door de zwaartekracht kunt u last krijgen van huidoverschot, soms ook een vetweefsel, spierweefsel of bindweefsel overschot. Bij de oogleden kan dit leiden tot een zwaar of moe gevoel, gezichtsveld beperking en hoofdpijn aan het voorhoofd. Een bovenooglid correctie kan dan geadviseerd worden.

Deze operatie wordt soms vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.



Behandeling



Een ooglidcorrectie kan klachten van moeheid, zwaar gevoel en visus beperking verminderen. Het is een kleine ingreep.

Herstel na behandeling

De operatie is een kleine ingreep. Na de operatie is het belangrijk dat u relatieve rust neemt. De kans op een complicatie is beperkt. Als het optreedt is het wel vervelend. Neem dan s.v.p. contact op met de Annadal kliniek om eerder gezien te worden:

- Een onaangenaam gevoel of zwelling: In de loop van dagen neemt dit meestal vanzelf af. U mag koelen.
- Bloeduitstorting of nabloeding. Tekenen van een nabloeding zijn pijn en plotse zwelling. Soms is er bloedverlies uit de wond.
- Ontsteking. Dit uit zich door zwelling en roodheid, meestal is er ook een toename van pijn.
- Opengaan van de wond: Soms gaat de wond een klein stukje open staan. Dit kan plots gebeuren of bijvoorbeeld na wrijven in de ogen.
- Pijn in het oog of zandkorrel gevoel: Sommige mensen ervaren klachten van een krassend gevoel bij het knippen. Soms staat het oog een klein beetje open na de operatie. Een ooggel of oogdruppels kunnen dan nodig zijn.
- Litteken gevoeligheid: Het litteken kan een tijdje gevoelig zijn. Soms is het litteken aan de zijkant zichtbaar. Littekenherstel kan lang duren. De ene persoon heeft meer last van de littekens dan een ander.

Resultaat

De meeste patiënten hebben snel resultaat van de behandeling. Het kan wel langer duren voordat vocht rondom het boven- en soms onderooglid verdwijnt.

Het litteken wordt gemaakt in de plooi van het bovenooglid. Het litteken is hierdoor grotendeels niet zichtbaar als u uw oog open hebt. Als u last hebt van surplus aan de zijkanten, dan kan het litteken daar wel zichtbaar zijn na de ingreep.

Lichte asymmetrie rechts ten opzichte van links kan na de operatie blijven. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk symmetrie.

Lichte rimpeltjes kunnen ook na de operatie weer ontstaan. Dit komt door te weinig elastiek in de huid.

Vaak is er een gecombineerd probleem met ook een te lage stand van de wenkbrauwen. Dan kan het zijn dat de bovenooglid correctie te weinig resultaat geeft. Bespreek dit vooraf dus goed met uw plastisch chirurg.

Informed consent

Een weloverwogen keuze is belangrijk voordat u geopereerd wordt. Mocht u na het doorlezen van deze folder en na het gesprek met uw plastisch chirurg nog vragen hebben, maak dan nog een afspraak op de poli of een telefonische afspraak.