

Adviezen rondom de operatie

- Mocht u nieuwe medicijnen voorgeschreven krijgen die u nog niet aan uw medisch specialist had doorgegeven, neem dan contact op. Sommige medicijnen hebben een nadelige invloed op het herstel na de operatie.
- De operatie vindt plaats onder lokale verdoving.
- Het is een korte ingreep.
- U mag gewoon eten en drinken vóór en na de operatie.
- Als het mogelijk is, wordt er een drukverband geplaatst, soms alleen een pleister.
- U mag niet zelf naar huis rijden.
- Een lichte pijnstiller zoals paracetamol kunt u na de operatie gebruiken als pijnstiller, tenzij u een allergie hebt tegen dit medicijn. (3 tot 4x per dag 1000mg).
- Geen sport, niet zwaar tillen tot de controle.
- Houdt het lichaamsdeel wat hoger. Bijvoorbeeld als het uw gelaat betreft: niet bukken en niet plat liggen.
- De wondcontrole vindt plaats na ongeveer 3-14 dagen na de operatie.

Wondzorg:

- Als de wond is gesloten met hechtingen kan de wond na 24 uur nat worden onder stromend water. Doe dit kortdurend. Droog de wond door te deppen met een schone handdoek.
- Als de wond open gelaten werd in afwachting van het pathologisch onderzoek, houdt de wond droog. U komt dan alweer snel op de poli voor wondverzorging.

Bij zorgen of problemen, neem contact op

Annadal Kliniek Maastricht
Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

T. 043 - 347 99 44
F. 043 - 347 30 70

www.annadal-kliniek.nl
info@annadal-kliniek.nl

Publicatiedatum 09-02-2023
eQuse 00870

Huidkanker

Door allerlei factoren kan de huidkanker ontwikkelen. Dit uit zich vaak door een plekje of een wondje dat niet geneest. Het blijft terugkeren. Soms groeit het snel en soms langzaam. Er is een grote variatie aan type huidkanker. Afhankelijk van het type huidkanker verschilt de behandeling. Soms is er aanvullende beeldvorming nodig (echo).



Als er huidkanker is vastgesteld hebt u een verhoogde kans om nog een plakje huidkanker te ontwikkelen. Kijk dan ook goed uw huid na om vroeg nieuwe plekjes op te sporen. Raadpleeg eventueel uw huisarts of dermatoloog hiervoor.

Behandeling



Sommige tumoren kunnen behandeld worden met zalf of stikstof. Een dermatoloog kan dit het beste met u bespreken.



Sommige huidtumoren kunnen niet anders dan met een operatie verwijderd worden. Soms leent de locatie van de tumor zich niet om met zalf of stikstof de tumor te behandelen.

Als de huidtumor te groot is, dan zal de huid niet meteen dichtgemaakt kunnen worden. Dan is het soms nodig om de wond open te laten totdat de patholoog microscopisch onderzoek naar het weefsel heeft gedaan. Een tweede operatie kan dan nodig zijn om de wond te sluiten.

Herstel na behandeling

De operatie is een kleine ingreep.

De kans op een complicatie is beperkt. Als het optreedt is het wel vervelend en neemt het herstel langer in beslag. Neem dan s.v.p. contact op met de Annadal kliniek om eerder gezien te worden:

- Een onaangenaam gevoel of zwelling: In de loop van dagen neemt dit meestal vanzelf af. U mag koelen.
- Bloeduitstorting of nabloeding. Tekenen van een nabloeding zijn pijn en plotse zwelling. Soms is er bloedverlies uit de wond.
- Openvallen wond: soms valt het wondje open. Zorg er dus voor dat u rust neemt zodat de wond goed kan genezen. Na 6w is het litteken op normale sterkte.
- Ontsteking. Dit uit zich door zwelling en roodheid, meestal is er ook een toename van pijn.
- Litteken problemen: Sommige mensen hebben meer last van het litteken dan anderen. Soms is het ook meer zichtbaar dan bij een ander. Dit heeft vaak te maken met uw elasticiteit in de huid en wondgenezing.
- Heroperatie: Mocht het verwijderde weefsel onder de microscoop toch nog tumorcellen in de rand laten zien, dan is een heroperatie nodig om meer weefsel te verwijderen.

Optimaal herstel van het litteken

Als uw wond genezen is, meestal nadat de hechting verwijderd zijn en de wond helemaal dicht is, mag u het litteken masseren. Vaseline is niet slechter dan litteken crèmes.

Bescherm het litteken tegen UV-straling, waaronder zonneschijn, totdat de kleur normaal (huidkleurig) is geworden. U kunt het litteken insmeren met SPF 50 zonnecreme (iedere 2u).

Behandeling van huidkanker gaat vaak in nauw overleg met een dermatoloog. Het wordt aanbevolen bij niet genezende wondjes of korstjes in een vroeg stadium uw huisarts of medisch specialist te consulteren. Patiënten die eenmaal huidkanker hebben gehad, hebben een hogere kans op het opnieuw verkrijgen van huidkanker.

Informed consent

Een weloverwogen keuze is belangrijk voordat u geopereerd wordt. Mocht u na het doorlezen van deze folder en na het gesprek met uw plastisch chirurg nog vragen hebben, maak dan nog een afspraak op de poli of een telefonische afspraak.